

ATRAGANTAMIENTO Y REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR



C. S. ARRABAL

Atragantamiento en Bebés

Qué es y Como actuar



OBSTRUCCIÓN CUERPO EXTRAÑO

¿Cuándo podemos sospechar
Atragantamiento?

- Inicio súbito de : Tos, náuseas, estridor, dificultad respiratoria, (sin otros signos de enfermedad
- Tras presenciar el episodio o antecedente reciente de estar comiendo o jugando con objetos pequeños

Reacción del niño:

TOS, intenta expulsarlo inmediatamente,
ii Animarlo a toser!!

EVITAR

- Dar golpes en la espalda
- Comprimirle el abdomen
- Ofrecerle algo de beber

Tres situaciones diferentes

- Niño consciente con tos efectiva:

Animarlo a toser

- Niño consciente con tos ineficaz:

Obstrucción

- Niño inconsciente:

RCP

Obstrucción: QUE HACER

- 1.- Verificar estado de consciencia
- 2.- Abrir boca, si ve el objeto realizar barrido de gancho, si no es así no introducir los dedos.

3.- AYUDA



MANIOBRAS PARA EXPULSAR OBJETO

- 1.- Sujetar al bebé y colocarlo boca abajo para dar golpes en la espalda en 5 ocasiones
- 2.- Colocarlo hacia arriba y dar sobre el 1/3 inferior del esternón 5 compresiones
- 3.- Realizar la maniobra hasta que se libere el objeto

Retirar el objeto con el dedo
ÚNICAMENTE si la persona lo puede ver




Colocar al bebé boca abajo a lo largo del antebrazo y darle 5 golpes fuertes y rápidos en la espalda con el talón de la mano



Colocar dos dedos en la mitad del esternón del bebé y dar 5 compresiones rápidas hacia abajo







[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=YT-OFJ0HRS4&FEATURE=YOUTU.BE&APP=DESKTOP](https://www.youtube.com/watch?v=YT-OFJ0HRS4&feature=youtu.be&app=desktop)



[Niños entre 1 y 8 años](#)

[2º Video](#)

ATRAGANTAMIENTO EN NIÑOS DE 1 A 8 AÑOS





<https://www.youtube.com/watch?v=WyaHAsE4yts>

<https://www.youtube.com/watch?v=2D5TKxDwGuk>